

玻尿酸注射劑說明

簡介：

玻尿酸是一種暫時性皮內或皮下填充劑。目前國內核准上市的玻尿酸注射劑可分為細菌發酵製成的玻尿酸及動物性玻尿酸，依據不同產品規格，可針對臉部肌膚紋路、皺紋及皺褶做修飾，此外亦可運用於豐唇及臉部輪廓的修飾。因為注射部位及使用產品不同，個人體質也不相同，因此注射後成效維持期長短也有差異。

適應症(僅列常用)：

凹疤、皺紋、臉部輪廓之修飾

注意事項：

1. 如有用阿斯匹靈或其他抗凝血劑，可能會增加注射部位瘀青及流血的風險，請告知你的醫師。
2. 注射後之傷口通常不須要特別照顧，但應避免在注射後當天做臉、敷臉等可能造成局部傷口感染之行為。
3. 於注射後約1-2天應盡量避免大力碰觸或按摩注射區域。此段時間可輕柔地使用水及肥皂清潔，同時輕微的卸妝是可被允許的。
4. 注射部位可能有輕微紅、腫脹、搔癢及注射部位有異常的觸感等，通常會在幾天後消失。如紅腫現象一直持續，則需要回診並進一步處理。
5. 豐唇治療後的腫脹情形會持續較久，可能長達一星期。
6. 為免玻尿酸被很快分解而失去療效，注射後請避免暴露在過熱過冷或是強熱光源的地方(如三溫暖、日光浴室、日光浴或極冷處)。

副作用及相對不適應症：

1. 孕婦、有感染性病灶之患者，治療前應由醫師評估。
2. 治療後可能會出現紫斑或瘀青現象，約2週左右會慢慢消退。
3. 注射部位可能有表面不平整現象，觸感異常，或是注入物產生位移的情形。
4. 注射部位的皮膚，可能因皮膚透光度改變而影響膚色。
5. 如有傷口感染或化膿，需接受抗生素治療。
6. 曾有臉部皰疹的患者，扎針處可能有引發皰疹發作的危險性。
7. 極少數患者可能出現過敏性肉芽腫。

臺灣皮膚科醫學會版權所有

請參考本會網站「皮膚雷射治療守則」